

**FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DES PATIENTS  
DÉTATOUAGE AVEC LE SYSTÈME ENLIGHTEN**

Par la présente, j'autorise le Docteur B. Mercadier, chirurgien plasticien FMH, à procéder à un traitement de détatouage. Je comprends que dans certains cas, la disparition totale du tatouage ne peut pas être obtenue et que plusieurs séances de traitement peuvent être nécessaires. L'action du laser peut modifier une partie ou la totalité des pigments avec pour effet un assombrissement du tatouage et dans rarement l'impossibilité de l'enlever.

La procédure peut entraîner les événements indésirables ou les risques suivants :

- GÈNE – Une gêne modérée à importante peut se produire lors des détatouages. La plupart des patients décrivent cette gêne comme inférieure à celle ressentie lors de l'application du tatouage. Certaines zones sont plus sensibles que d'autres. Les anesthésiques topiques et locaux peuvent être utilisés au besoin.
- PURPURA – La zone peut sembler meurtrie après le traitement. L'hématome s'estompe en général dans les 5 à 7 jours.
- CLOQUES/SQUAMES/CROÛTES – Susceptibles de se produire et se cicatrisent en général dans les 4 à 10 jours.
- PÉTÉCHIE ou POINTS D'HÉMORRAGIE – Des points d'hémorragie ou des suintements peuvent apparaître et persister pendant 2 jours après le traitement.
- HYPERPIGMENTATION/HYPOPIGMENTATION – La peau peut devenir temporairement plus claire ou plus sombre après le traitement laser. L'hyperpigmentation peut être aggravée par une exposition au soleil. L'hypopigmentation se produit en général après plusieurs traitements. Les problèmes de pigmentation se résorbent en général avec le temps mais peuvent être irréversibles.
- MODIFICATIONS DE LA TEXTURE DE LA PEAU – Des modifications transitoires de la texture de la peau sont souvent constatées mais disparaissent en général avec le temps.
- ŒDÈME ET ÉRYTHÈME – Une ecchymose et une rougeur peuvent survenir mais elles s'estomperont dans les 2 à 5 jours et peuvent être atténuées par application régulière de glace.
- RÉACTION ALLERGIQUE – Les patients qui ont eu une réaction allergique à l'encre lors de l'application du tatouage pourront réagir de façon similaire après le traitement laser. La réaction allergique est imprévisible avec plus ou moins de gravité, pouvant aller jusqu'au décès. Veuillez nous informer de tous les effets secondaires rencontrés lors de l'application du tatouage.
- INFECTION – Malgré une prise en charge appropriée des plaies, des douleurs, des ecchymoses, des suintements et de la fièvre peuvent indiquer le début d'une infection. Des antibiotiques topiques et/ou oraux peuvent être nécessaires. En cas de signes d'infection, comme des douleurs, une sensation de chaleur ou une rougeur diffuse, veuillez appeler notre cabinet au +41 21 324 04 44.
- CICATRICES – La formation de cicatrices se produit rarement, mais doit toujours être envisagée si la surface de la peau est altérée. Pour réduire le risque d'apparition de cicatrices, il est impératif que vous suiviez à la lettre toutes les instructions post-traitement qui vous seront données. De bons soins post-opératoires peuvent permettre de réduire le risque d'apparition de cicatrices.
- ÉLIMINATION PARTIELLE DU TATOUAGE – Plusieurs séances de traitement peuvent être nécessaires et l'élimination totale du tatouage n'est pas toujours possible. Les couleurs et compositions d'encre ne réagiront pas toutes au traitement.
- OBSCURCISSEMENT PARADOXAL OU CHANGEMENT DE COULEUR – Certaines encres de tatouage, y compris les tons clairs et les couleurs chairs, peuvent s'assombrir ou changer de couleur en réponse au traitement.
- « BAVURE » DE L'ENCRE DANS LA PEAU ENVIRONNANTE – Peut provoquer un maculage ou une perte de définition du tatouage, plutôt que son élimination.
- EXPOSITION AU SOLEIL/LAMPES À UV/BRONZAGE ARTIFICIEL – Susceptibles d'augmenter les risques d'effets secondaires et d'événements indésirables.
- EXPOSITION DES YEUX – Des lunettes de protection (écrans) vous seront fournies pendant le traitement. Des lésions oculaires graves et permanentes peuvent survenir si les yeux ne sont pas protégés pendant toute la durée du traitement.

Je reconnais que les points suivants ont été abordés :

- Avantages potentiels de l'intervention proposée, y compris la possibilité que l'intervention puisse être sans effet
- Autres traitements, y compris la possibilité de ne pas éliminer le tatouage
- Complications/risques possibles associés à l'intervention proposée et période de cicatrisation qui s'ensuit

Pour les femmes en âge de procréer : En apposant ma signature ci-dessous, je confirme que je ne suis pas enceinte et que je n'ai pas l'intention de tomber enceinte au cours du traitement. En outre, j'accepte d'informer le Docteur B. Mercadier et son équipe en cas de grossesse éventuelle pendant la durée du traitement.

J'ai informé le Docteur Mercadier de l'ensemble de mes éventuels problèmes de santé ou antécédents de chirurgie ou d'hospitalisation, allergie ou prise de médicaments (notamment aspirine, anti-inflammatoire non stéroïdien). Je m'engage à venir à l'ensemble des consultations et des séances de traitement.

Des clichés photographiques de référence seront réalisés. Par la présente, j'autorise \_\_\_ je n'autorise pas l'utilisation de mes clichés photographiques à des fins pédagogiques.

**CONFIRMATION**

**EN APPOSANT MA SIGNATURE CI-DESSOUS, JE RECONNAIS AVOIR LU ET COMPRIS L'ENSEMBLE DU CONTENU DE CE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ À L'ÉLIMINATION PARTIEL OU TOTALE DE MON TATOUAGE, ET AVOIR REÇU DES RÉPONSES SATISFAISANTES ET DES EXPLICATIONS CLAIRES ET COMPREHENSIBLES À TOUTES MES QUESTIONS.**

Signature-Patient ou tuteur

Nom (en caractères d'imprimerie)/lien avec le patient

Date